

УТВЕРЖДАЮ:



Заместитель директора
ООО «СЦЛХ»
Михеенко Т.Н.

«1» сентября 2025 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СВЯЗАННЫХ С НИМИ РИСКАХ, ВИДАХ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Возможные риски и осложнения, сопутствующие вмешательству (*комбинированному лечению варикозной болезни, включая эндовенозную лазерную коагуляцию*), которые могут развиваться вовремя или сразу после медицинского вмешательства, в том числе:

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Некроз кожи и подкожно-жировой клетчатки;
- Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематом;
- Повреждение нервов, ожоги кожи, повышении температуры до 38⁰ до 7 дней;
- Возникновение артериовенозной фистулы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Термоиндуцированный тромбоз;
- Аллергические реакции на вводимые препараты и/или местные анестетики;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоза, летального исхода.
- жжение – зуд кожи, в области манипуляций;
- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- дыхательные нарушения: затруднение вдоха, тяжесть за грудиной, кашель, чувство саднения, жжения в дыхательных путях;
- неврологические нарушения: мигреноподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства, которые исчезают через 2-12 месяцев;
- в редких случаях через 2-4 недели после лечения по ходу склерозированной вены может появиться тонкая красноватая сосудистая «сетка», обычно самостоятельно исчезающая в течение 4-6 месяцев.