

УТВЕРЖДАЮ:



Заместитель директора
ООО «СЦЛХ»
Михеенко Т.Н.

«1» сентября 2025 г.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА, ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Номер	результат оказания медицинских услуг, выполнения работ	правила, условия сохранения эффективно го и безопасного результата лечения	Гарантийны й срок на достижение и лечебный результат	Необходимы е действия по истечению гарантийно го срока результата лечения	возможные последствия бездействия при истечении гарантийного срока результата лечения
1	Микропенная склеротерапия, микросклеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	увеличение количества ТАЭ, внутрикожных ретикулярных вен

компрессионного белья.

2	Стволовая склеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 1*
3.	ЭВЛК	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников в. Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*

4	«Тотал» - ЭВЛК	Исключение посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников. Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*
5	Минифлебэктомия	Исключение посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников. Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*

Примечание 1*

- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- неврологические нарушения: мигреноподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- симптоматический тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия с вероятным развитием летального исхода.

Примечание 2*

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематомы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоза,
- летального исхода.